


Figure 1: Taux et temps moyens de germination de 5 espèces d'acacia (AT : *Acacia tortilis*, AS : *Acacia salicina*, AP : *Acacia pendula*, AF : *Acacia floribunda*, Acy : *Acacia cyanophylla*) sous l'effet des différentes températures et traitements (Te : témoin, EB : eau bouillante, SC : scarification manuelle, AS1 : acide sulfurique concentré. T1=20 °C, T2 = 25 °C, T3=30 °C).













Figure 2: Cinétique de germination des 5 espèces d'acacia en fonction du temps (AT : *Acacia tortilis*, AS : *Acacia salicina*, AP : *Acacia pendula*, AF : *Acacia floribunda*, Acy : *Acacia cyanophylla*) sous l'effet des différentes températures et traitements (Te : témoin, EB : eau bouillante, SC : scarification manuelle, AS1 : acide sulfurique concentré. T1=20 °C, T2 = 25 °C, T3=30 °C).








Figure 3: Taux et temps moyen de germination en fonction des espèces d'acacia (AT : *Acacia tortilis*, AS : *Acacia salicina*, AP : *Acacia pendula*, AF : *Acacia floribunda*, ACy : *Acacia cyanophylla*) et du traitement salin (T₀: 0g.l⁻¹ ; T₁: 3g.l⁻¹ ; T₂: 6g.l⁻¹ ; T₃: 9g.l⁻¹ ; T₄: 12g.l⁻¹ et 15 g.l⁻¹ NaCl).




Figure 4: Cinétique de germination de 5 espèces d'Acacia (*A. tortilis*, *A. salicina*, *A. pendula*, *A. floribunda* et *A. cyanophylla*) pour chaque concentration de NaCl (0, 3, 6, 9, 12, 15 g/l).




Figure 5: Taux et temps moyen de germination en fonction des 5 espèces d'acacia (AT : *Acacia tortilis*, AS : *Acacia salicina*, AP : *Acacia pendula*, AF : *Acacia floribunda*, Acy : *Acacia cyanophylla*) et du stress hydrique (0 bars, -2 bars, -4 bars, -6 bars et -8 bars).




Figure 6: Cinétique de germination de 5 espèces d'acacia (*A. tortilis*, *A. salicina*, *A. pendula*, *A. floribunda* et *A. cyanophylla*) pour chaque pression osmotique (0, -2, -4, -6 bars).

